

अदुवाको गानो कुहिने रोग (Rhizome Rot)

अदुवाको गानो कुहिने रोग बीउ गानो तथा माटोको माध्यमबाट सर्दछ । २५- ३५ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम, लामो समय सम्म सिमसिमे पानी परेको तथा पानी जमेको अवस्था यो रोगको लागि अनुकूल हुन्छ । कुहिएको भागले अरु ब्याक्टेरिया, दुसी तथा किराहरुलाई आकर्षित गर्छ । वर्षातको समयमा यो रोग छिटै फैलिन्छ ।

रोगको लक्षण:

- बोटको पातको टुप्पोबाट पहेँलिदै जाने, बोट लड्दैन तर पहेँलेन्छ र मर्दछ ।
- गानो र डाँठ जोडिएको भागमा पानीले भिजेको जस्तो भएर गिलो हुँदै जाने र बिरुवा तान्दा सजिलै पातसँग छुट्टिएर आउँछ भने गानो जमिनमै छोडिन्छ ।

व्यवस्थापन:

- पानी जम्न नदिई निकासको राम्रो व्यवस्था मिलाउने
- नाइट्रोजन युक्त मलको बढी प्रयोगले रोगको प्रकोप बढ्छ । त्यसैले रासायनिक मलको प्रयोग सन्तुलित मात्रामा गर्ने र कम्पोष्ट मलको प्रयोगमा बढी जोड दिने गर्नुपर्दछ ।
- प्रारम्भिक लक्षण देखिना साथ कार्बेन्डाजिम ५०% WP @ २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई रोगी बिरुवा तथा त्यसको वरपरका बिरुवाहरु र माटो समेत भिज्ने गरी उपचार गरेमा रोग फैलिने क्रमलाई कम गर्न सकिन्छ ।
- छहारी भएको ठाँउमा रोगको प्रकोप बढी हुने भएकोले हल्का मात्र छहारी दिने बिरुवाहरु अन्तरवालीमा लगाउन सकिन्छ ।
- रोग लागेको जमिनमा पुनः अदुवा नलगाउने, दुसीको जीवाणु माटो वा रोगी गानो/ डाँठमा २ वर्ष सम्म जीवित रहन सक्ने हुदाँ अनिवार्य वाली चक्र अपनाई ३ वर्षमा एक पटक मात्र अदुवा लगाउने
- ट्राइकोडर्माबाट बीउ उपचार एवं माटो उपचार गर्न सकिन्छ ।
- बोटहरू गाना कुहिने रोगबाट संक्रमित भएका छन् भने (मेटालक्सिल ८% + म्यानकोजेब ६४%) विषादी १ ग्राम अथवा अन्य विषादीहरू (कार्बेन्डाजिम १२% + म्यानकोजेब ६३%) २ ग्राम विषादी प्रति लिटर पानीका दरले तयार पारेको घोलले जरा सम्म भिज्ने गरी ड्रेन्चिङ गर्ने ।



चित्र : अदुवाको गानो कुहिने रोग