

बागमती प्रदेश सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि विकास कार्यालय
सिन्धुली

धानको काँडादार खपटे (Rice hispa):

पहिचान: वयस्क खपटे किरा निलो- कालो रंगको काँडादार पखेटा भएका हुन्छन् ।

क्षतिको लक्षण: यसले नोक्सान पुर्याएको पातमा सेता धर्साहरू र सेता धब्बाहरू देखिन्छन् ।

व्यवस्थापनका विधिहरू:

- ✓ बेर्नाको पातको टुप्पोमा देखिएका फूलहरूलाई पातको टुप्पो चुँडेर नष्ट गर्ने ।
- ✓ व्याडमा पानी टम्म जमाएर पानीमा उत्रेका खपटेहरूलाई जम्मा गरी नष्ट गर्ने ।
- ✓ लाम्डासाइहेलोथ्रिन ५% इ सी (जस्तै एजेन्टप्लस, कराते, सूर्य एजेन्ट) ०.५ मिलि प्रति लिटर पानीमा मिसाइ स्प्रे गर्ने वा मालाथियन ५०% इ सी (जस्तै साइथियन, अनुमालाथियन, सूर्याथियन) १.५ मिलि प्रति लिटर पानीमा मिसाइ छर्ने ।



चित्र १: काँडादार खपटेको वयस्क

चित्र २: काँडादार खपटेको क्षति